

IV Iron jintuża għall-kura ta' deficjenza tal-ħadid meta preparazzjonijiet orali ma jkunux effettivi jew ma jkunux jistgħu jintużaw.

IV Iron jista' jikkawża reazzjonijiet allerġiči u jrid jingħata minn persuni mħarrġa biex jevalwaw u jimmaniġġjaw dawn ir-reazzjonijiet.

F'xi pazjenti dawn ir-reazzjonijiet allerġiči jistgħu jsiru severi jew ta' periklu għall-ħajja (magħrufa bħala reazzjonijiet anafilattici) u jistgħu jikkawżaw problemi fil-qalb u l-pressjoni tad-demm tiegħek u/jew jikkawżawlekk li jħossok ħażin jew tintilef minn sensik.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok kwalunkwe effetti sekondarji, kellem lit-Tabib jew lill-infermier/a tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli anke jekk m'humix imniżżla f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament lil: ADR Reporting, The Medicines Authority, Post-Licensing Directorate, 203 Level 3, Rue D'Argens, GZR-1368 Gżira, Website: www.medicinesauthority.gov.mt, e-mail: postlicensing.medicinesauthority@gov.mt.

Intravenous (IV) Iron

Informazzjoni Importanti għal

Pazjenti Dwar ir-Riskju Possibbli ta' Reazzjonijiet Allerġiči Serji b'IV

iron (medikazzjoni mogħtija għol-vina permezz ta' labra)

Din l-informazzjoni ġiet ippreparata u pprovduta lilek mill-manifatturi ta' IV iron fl-Ewropa.

Jekk jogħġbok aqra dan il-fuljett b'attenzjoni u ddiskuti kwalunkwe mistoqsijiet li jista' jkollok mat-Tabib tiegħek.

Jista' jkollok żieda fir-riskju li jkollok reazzjoni allergika jekk għandek:

- allerġiji magħrufa li jinkludu allergija għal medċina
- storja ta' ażżma severa, ekżema jew allergiji oħrajn (pereżempju allergiji għat-trab, polline, materjal mill-animali) jew
- kundizzjonijiet immuni jew infjammatorji (eż. arrite rewmatoid, lupus erythematosus u oħrajn)

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek qabel ma jagħtik riċetta jew jagħtik IV Iron jekk għandek kwalunkwe minn dawn l-allergiji jew kundizzjonijiet.

It-Tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk il-benefiċċju għalik huwiex akbar mir-riskju.

M'għandekx tingħata riċetta jew IV

Iron jekk:

- inti allerġiku (għandek sensitività eċċessiva) għall-prodott jew kwalunkwe mill-ingredjenti ta' din il-medċina
- kellek reazzjonijiet allergiči (sensitività eċċessiva) serji għal kuri oħrajn b'IV iron fil-passat*
- għandek ammont eċċessiv ta' ħadid (ħadid żejjed f'għismek)
- I-anemija tiegħek mhijiex ikkawżata minn defiċjenza ta' ħadid

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek qabel ma jagħtik riċetta/jagħtik IV Iron jekk għandek kwalunkwe minn dawn l-allergiji jew kundizzjonijiet.

*** Hu importanti li tkun taf li reazzjoni xorta tista' sseħħi anki jekk inti ma kellek l-ebda problemi fil-passat b'IV iron.**

Tqala: IV iron m'għandux jintuża waqt it-tqala ħlief jekk ikun hemm bżonn b'mod ġar. Jekk int tqila jew taħseb li tista' tkun tqila, hu importanti li tiddiskuti mat-tabib tiegħek.

Għandek tikkuntattja lit-tabib jew infermier/a tiegħek immedjatament jekk:

- għandek kwalunkwe sinjali jew sintomi ta' reazzjoni allergika waqt jew ftit wara l-kura b'IV Iron

Pereżempju: urtikarja jew raxx, ħakk, sturdament, mejt, nefha fix-xufftejn, l-ilsien, il-grizmejn jew il-ġisem, diffikultà biex tieħu n-nifs, qtugħi ta' nifs jew tħarħir.

- It-Tabib tiegħek ser jimmonitorjek għal sinjali u sintomi ta' reazzjoni allergika għal tal-anqas 30 minuta wara kull darba li IV iron hu mogħti lilek.