


Gwida għall-Pazjent: Affarijiet importanti x'tiftakar b'rabta mat- trattament b'Gilenya® (fingolimod)▼

▼ Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonal. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġidida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħha huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.

Xi tkun l-iskleroži multipla (MS)?

L-MS hi kundizzjoni fit-tul li taffettwa s-sistema nervuža centrali (CNS), magħmula mill-moħħ u s-sinsla. Fl-MS, l-infjammazzjoni teqred il-kisja protettiva (imsejħha myelin) ta' madwar in-nervituri fis-CNS u twaqqaf in-nervituri milli jaħdmu kif jixraq. Dan jissejja ġen demjelinizzazzjoni.


MS li tirkadi u tbatti hi kkaratterizzata minn attakki spissi (rikaduti) li jirriflettu l-infjammazzjoni li hemm fis-CNS. Is-sintomi jvarjaw minn pazjent għal ieħor. Is-sintomi ta' rikaduta jafu jegħbu għal kollox meta din tgħaddi, imma wħud mill-problemi jafu jibqgħu.



Kif jaħdem Gilenya?

Ma nafux għal kollox kif taħdem it-terapija b'Gilenya fuq I-MS.

Gilenya jgħinek billi jħarsek minn attakki fuq is-CNS mis-sistema immuni billi jnaqqas il-ħila ta' wħud miċ-ċelluli bojod tad-demm (il-limfoċiti) li jiċċaqlu kif iridu fil-ġisem u billi jwaqqafhom milli jilħqu l-moħħ u l-ispina. Dan jillimita l-ħsara fuq in-nervituri li ssir mill-MS. Gilenya jnaqqas ukoll uħud mir-reazzjonijiet immuni ta' ġismek.



Kontraindikazzjonijiet u prekawzjonijiet



Gilenya (fingolimod) m'għandux jintuża minn pazjenti b'mard tal-qalb speċifiku, u mhuwiex irrakkommandat għal pazjenti li qed jieħdu wkoll medicini magħrufin li jnaqqsu r-rata tat-taħbit tal-qalb.

Gilenya m'għandux jintuża minn nisa tqal u nisa li jistgħu joħorġu tqal (inkluż tfajliet adolexxenti) li mhumiex qed jużaw kontraċeżżjoni effettiva.



It-tabib tiegħek se jitlobok tibqa' fiċ-ċentru tas-saħħha jew klinika għal sitt sigħat jew aktar wara li tieħu l-ewwel doža ħalli b'hekk ikunu jistgħu jittieħdu l-miżuri li jixirqu jekk isseħħu effetti sekondarji. Jaf ikun hemm ċirkustanzi fejn ikun meħtieġ li tinżamm hemm sal-ġħada

F'każ ta' pazjenti pedjatriċi, se jittieħdu prekawzjonijiet simili jekk id-doža tiżdied minn 0.25 mg għal 0.5 mg darba kuljum.

Kontraindikazzjonijiet u prekawzjonijiet



In-nisa kollha li jistgħu joħorġu tqal (inkluż tfajliet adolexxenti) se jingħataw kartuna li tfakkar lill-pazjenti speċifikament dwar it-tqala.



Jekk jogħġgbok aqra sew il-Fuljett ta' Tagħrif għall-Pazjent qabel ma tibda t-trattament b'Gilenya



Jekk jogħġgbok informa lit-tabib tiegħek jekk inti jew xi qarib tiegħek, għandkom storja ta' epilessija.



Ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jekk iġġarrab xi reazzjonijiet mhux mixtieqa matul it-trattament b'Gilenya jew f'każ ta' tqala.

Jekk jogħġgbok għid lil kwalunkwe tabib li jarak li qed tieħu Gilenya.

Qabel it-tnedija tat-trattament b'Gilenya



Tqala – Gilenya huwa teratogeniku. Nisa li jistgħu joħorġ tqal (inkluż tfajlietadoloxxenti) għandhom ikunu mgħarrfa mit-tabib tagħhom dwar ir-riskji serji li għandu Gilenya għall-fetu, irid ikollhom test tat-tqala negattiv (ivverifikat minn professjonist mill-qasam tal-kura tas-saħħha), u għandhom jieħdu kontraċezzjoni effettiva qabel ma jinbeda t-trattament b'Gilenya.



Kanċer relatat mal-virus tal-papilloma umana (HPV) – It-tabib tiegħek se jevalwa jekk għandekx bżonn tagħmel screening għall-kanċer (inkluż test tal-Pap) u jekk għandekx titlaqqam kontra l-HPV.



Funzjoni tal-fwied – Gilenya jista' jwassal għal riżultati mhux normali fit-testijiet tal-funzjoni tal-fwied. Se jkollok bżonn tagħmel test tad-demm qabel ma jinbeda t-trattament b'Gilenya.



Aċċessjonijiet – Matul it-trattament jistgħu jseħħu aċċessjonijiet. Għarraf lit-tabib tiegħek jekk inti jew xi qarib għandkom storja ta' epilessija.

L-ewwel darba li tieħu Gilenya



Rata baxxa tat-taħbit tal-qalb u taħbit tal-qalb irregolari

Malli jinbeda t-trattament, Gilenya jwassal biex titbaxxa r-rata tat-taħbit tal-qalb. Dan jiġi jwassal biex tħossok stordut jew titbaxxa l-pressjoni tad-demm. Jekk tesperjenza sintomi bħal sturdament, dardir, mejt, jew palpitazzjonijiet jew tħossok skomdu wara li tieħu l-ewwel doža ta' Gilenya, jekk jogħġibok għarraf minnufih lit-tabib tiegħek.

Qabel tieħu l-ewwel doža, se:

- Ikollok elettrokardjogramma (ECG) fil-linja bażi li jevalwa kif qed taħdem qalbek
- Titkejjillek il-pressjoni tad-demm

Il-pazjenti pedjatriċi se jittihdulhom ukoll it-tul u l-piż, u se ssirilhom evalwazzjoni tal-iżvilupp fiziku tagħhom.

L-ewwel darba li tieħu Gilenya

Waqt is-sitt sigħat osservazzjoni:



- Se jiċċekkjawlek il-polz u l-pressjoni tad-demm kull siegħa
 - Matul dan il-ħin taf tibqa' taħt osservazzjoni permezz ta' ECG kontinwu
- ECG malli jgħaddu s-sitt sigħat



Čempel lit-tabib tiegħek f'każ li jitwaqqaf it-trattament. Jekk waqquft Gilenya għal ġurnata jew aktar matul l-ewwel ġimaghtejn mit-trattament, jew għal aktar minn sebat ijiem matul it-tielet u r-raba' ġimgħha mit-trattament, jew jekk Gilenya twaqqaf għal aktar minn ġimaghtejn wara li jkun ilu jingħata għal mill-inqas xahar, l-effett tal-bidu fuq ir-rata tat-taħbit tal-qalb jaf jerġa' jfejjg. Meta terġa' tibda terapija b'Gilenya, it-tabib tiegħek jaf jiddeċiedi li jibqa' josserva rrizultati tar-rata tat-taħbit ta' qalbek u tal-pressjoni ta' qalbek kull siegħa, li jagħmel ECGs, u jekk meħtieġ, li jżommok għal aktar osservazzjoni sal-ġħada.

Waqt li qed tieħu Gilenya



Infezzjonijiet – Minħabba li Gilenya jaffettwa s-sistema immuni, hemm aktar čans li tlaqqat infezzjonijiet. Jekk taħseb li għandek xi waħda minn dawn li ġejjin, matul it-trattament u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf, ċempel lit-tabib tiegħek minnufih: infezzjoni, influwenza, uġigħ ta' ras flimkien ma' ebusija f'għonqok, sensitività għad-dawl, dardir u/jew konfużjoni (jafu jkunu sintomi ta' meningħite).

Jekk taħseb li I-MS tiegħek sejra għall-agħar (eż. thossox dgħajnej jew ikollok tibdil fil-vista) jew jekk tinnota xi sintomi ġodda, kellem lit-tabib tiegħek minnufih. Dawn jafu jkunu s-sintomi ta' disturb rari fil-moħħ imsejjaħ lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML), li tiġi minn infezzjoni.

Waqt li qed tieħu Gilenya



Kanċer tal-ġilda – Kienu rrappurtati kanċers tal-ġilda f'pazjenti bi skleroži multipla ttrattati b'Gilenya. Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk tinnota li għandek xi boċoċ fil-ġilda (eż. boċoċ ileqqu donnhom perli), irqajja' jew feriti miftuħha li ma jfiqux fi żmien ftit ġimġħat. Sintomi ta' kanċer tal-ġilda jistgħu jinkludu tkabbir anormali jew tibdiliet fit-tessut tal-ġilda (eż. għażżez mhux tas-soltu) b'tibdil fil-lewn, għamlha jew daqs maż-żmien.



Funzjoni tal-fwied – Gilenya jista' jwassal għal riżultati anormali tat-testijiet tal-funzjoni tal-fwied. Se jkollok bżonn test tad-demm fl-ewwel, it-tielet, is-sitt, id-disa`, u t-tanax-il xahar waqt it-terapija b'Gilenya u wara b'mod regolari.

Waqt li qed tieħu Gilenya



Tqala – Nisa li jistgħu joħorġu tqal (inkluż tfajliet adoloxxenti) għandhom isirulhom testijiet tat-tqala b'mod ripetut b'intervalli xierqa waqt li għaddejjin bit-trattament b'Gilenya.



Għandek tirċievi pariri ta' spiss bl-għajjnuna tal-kartuna li tfakkar lill-pazjenti speċifikament dwar it-tqala mingħand professionist mill-qasam tal-kura tas-saħħha dwar ir-riskji serji għall-fetu minħabba Gilenya.



Għandek tuża kontraċezzjoni effettiva waqt li qed tieħu Gilenya, u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf it-trattament minħabba r-riskji serji ta' Gilenya għall-fetu.



Irrapporta minnufih lit-tabib tiegħek kull tqala (bi īnsieb jew le) waqt li qed tieħu t-trattament b'Gilenya u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf.

Waqt li qed tieħu Gilenya



Sintomi viživi – Gilenya jista' jikkawża nefha fuq wara tal-ghajn, kundizzjoni magħrufa bħala edema makulari. Għid lit-tabib tiegħek jekk ikollok xi tibdiliet fil-vista waqt it-trattament u sa xahrejn minn wara li jitwaqqaf.



Dipressjoni u ansjetà – Iż-żewġ kundizzjonijiet kienu rrappurtati fost pazjenti pedjatriċi ttrattati b'Gilenya. Jekk ikollok sintomi kellem lit-tabib tiegħek.



Malli titwaqqaf it-terapija b'Gilenya jista' jwassal sabiex il-marda terġa' tħiġi. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk għandekx bżonn ta' osservazzjoni, u kif, wara li jitwaqqaf Gilenya.

Noti:

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġibok irreferi għall-fuċċett ta' tagħrif.



Reazzjonijiet avversi suspettati u żbalji bl-użu ta' prodotti medicinali assoċjati mall-itħebid ta' **Gilenya** għandom jiġu rrapporati lill:-

Awtorita' Dwar il-Mediċini,

Sir Temi Zammit Buildings,

Malta Life Sciences Park,

San Gwann SGN 3000.

Jew fuq: www.medicinesauthority.gov.mt/adrportal

Inkella lil: Novartis Pharma Services Inc. Representative Office Malta fuq numru tat-telefawn +356 21222872.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlanda.

Rappreżtant lokali għad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Pharma Services Inc., Representative Office Malta. Numru tat-telefawn: +356 21222872.

Gilenya hu marka rreġistrata ta' Novartis Pharma AG.

Novartis Pharma AG CH-4002 Basel, Switzerland

©2019 Novartis Pharma AG