



Gwida ghall-Pazjenti u I-Kuraturi

Affarijiet importanti x'tiftakar dwar
it-trattament tiegħek b'MAYZENT®
(siponimod) ▼

▼ Dan il-prodott medicinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonal. Dan se jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-sahħha mitluba jirrapportaw kull reazzjoni avversa suspettata.

Werrej

| | |
|--|----|
| Daħla | 3 |
| L-Iskleroži Multipla (SM) | 4 |
| MAYZENT® | 5 |
| Qabel ma tieħu MAYZENT® | 6 |
| L-ewwel darba li tieħu MAYZENT® | 9 |
| Tnedija tat-trattament tiegħek b'MAYZENT® | 10 |
| Skeda tat-trattament b'MAYZENT® | 11 |
| Effetti sekondarji u riskji potenzjali | 12 |
| Pazjenti nisa | 16 |
| Tilqimiet | 17 |
| Meta tinsa tieħu l-pilloli tiegħek u twaqqaf it-trattament | 18 |
| Meta twaqqaf it-trattament tiegħek b'MAYZENT® | 19 |
| Dettalji fejn tikkuntattja lit-tabib tiegħek | 20 |

Dahla



Din il-gwida fiha tagħrif importanti dwar id-doži ta' MAYZENT® (siponimod), l-effetti sekondarji u r-riskji li jista' jkun hemm, inkluż gwida f'każ ta' tqala.

Qabel ma tibda t-trattament tiegħek, aqra sew din il-gwida u l-fuljett ta' tagħrif, li jinsab fuq ġewwa tal-kaxxa tiegħek bil-mediċina MAYZENT®. Il-fuljett ta' tagħrif fuq ġewwa tal-kaxxa fih tagħrif ieħor dwar l-effetti sekondarji li jistgħu jinqalghu.

Warrab din il-gwida flimkien mal-fuljett ta' tagħrif fuq ġewwa tal-kaxxa f'każ li jkollok bżonn tirreferi għalihom inti u għaddej bit-trattament. Għid lil kull tabib li tara li qed tieħu trattament b'MAYZENT®.

Uża l-iskeda tat-trattament li hemm f'paġna 11 meta tibda tieħu t-trattament b'MAYZENT®.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, importanti li tirrapporta dan l-it-tieb tiegħek. Dan jinkludi kull effett sekondarju possibbli li mhux imniżżejjel fil-fuljett ta' tagħrif fuq ġewwa tal-kaxxa.

L-Iskleroži Multipla (SM)



L-Iskleroži Multipla (SM) hi marda newroloġika li taffettwa l-moħħ u x-xewka tad-dahar.

F'pazjenti bl-SM, iċ-ċelluli immunitarji tal-ġisem innifsu jattakkaw bi żball iċ-ċelluli nervuži fil-moħħ u fix-xewka tad-dahar. Mal-medda taż-żmien, dawn iċ-ċelluli nervuži jintilfu, u dan iwassal biex tiżdied id-diżabbiltà.

Għal xi wħud, is-sintomi jmorru għall-agħar bil-mod il-mod minn mindu tfeġġ din il-marda u dan b'mod progressiv (SM progressiva), filwaqt li għal oħrajn is-sintomi jmorru u jiġu (SM b'rīkaduta u remittenti).

Fi żmien għaxar snin aktar minn 50% tal-pazjenti li għandhom SM b'rīkaduta u remittenti se jiżviluppaw eventwalment sitwazzjoni fejn is-sintomi se jkomplu jmorru għall-agħar, indipendentament minn jekk hemmx rikaduti jew le, li jwassal għal diżabbiltà. Din tissejjaħ skleroži multipla progressiva sekondarja (SMPs).



MAYZENT® fih sostanza attiva msejħa siponimod, li hi modulatur tar-riċettur tal-isfingosina-1-fosfat (S1P).

Jintuża sabiex jittratta adulti bil-marda tal-SMPS attiva.

MAYZENT® jaħdem billi jwaqqaf iċ-ċelluli immunitarji tal-ġisem innifsu (iċ-ċelluli l-bojod tad-demm) milli jgħaddu għal ġol-moħħ u x-xewka tad-dahar u jattakkaw iċ-ċelluli nervuži.

Studju mdaqcas f'fażi 3 sab li MAYZENT® jista' jbatti l-effetti tal-attività tal-marda, fosthom li d-diżabbiltà taggrava, li jiffurmaw leżjonijiet fil-moħħ u li jkun hemm rikaduti.

Qabel ma tieħu MAYZENT®

Testijiet u thejjijiet għat-trattament



Il-ħeffa li biha MAYZENT® jitkisser fil-ġisem tvarja minn pazjent għal iehor, u għaldaqstant nies differenti jeħtieġu doži differenti.

Qabel ma tibda t-trattament, it-tabib tiegħek se jagħmillek test tad-demm jew tar-riq (kampjun mill-ħalq) sabiex jiddetermina kemm MAYZENT® qed jitkisser sew f'ġismek ħalli jasal għall-aħjar doža għalik. F'ċerti każijiet, it-test se juri li MAYZENT® mhuwiex l-aħjar għażla ta' trattament għalik.

It-tabib jaf jagħmillek ukoll test tad-demm sabiex jiċċekkja l-għadd tad-demm sħiħ kif ukoll biex tiġi evalwata l-funzjoni tal-fwied tiegħek.



Jekk qabel ma kellekx il-ġidri r-riħ jew jekk ma tiftakarx li qabditek, jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek. Jekk m'intix imħares kontra l-virus, se jkollok bżonn tilqjima qabel ma tibda t-trattament b'MAYZENT®. F'dan il-każ, it-tabib se jtawwal b'xahar minn meta tkun ħad-ding il-kors sħiħ ta' tilqimiet biex jibda t-trattament b'MAYZENT®.

Qabel ma tieħu MAYZENT®

Testijiet u thejjijiet għat-trattament



Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek, jew qatt kellek qabel, disturbi fil-vista jew problemi fil-vista fiċ-ċentru tal-ghajnejn (edema makulari), infjammazzjoni jew infezzjoni fl-ġħajnejn (uveite), jew jekk għandek livell ġħoli ta' zokkor fid-demm (dijabete). Jekk għandek storja ta' xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerixxi li tagħmel eżami tal-ġħajnejn qabel ma tkun tista' tibda t-trattament b'MAYZENT®.



Jekk tbat minn xi kundizzjoni tal-qalb jew qed tieħu trattamenti li jistgħu jwasslu biex titbaxxa r-rata tat-taħbit tal-qalb tiegħek, it-tabib tiegħek se joħodlok il-pressjoni tad-demm u jagħmillek test imsejja ħażżeen elettrokardjogramma (ECG) biex jiċċekkja r-ritmu ta' qalbek qabel ma jinbeda t-trattament b'MAYZENT®. It-tabib tiegħek jaf firreferik ukoll għand speċjalist tal-qalb (kardjologu) għal parir dwar kif għandek tibda t-trattament b'MAYZENT®, u x'tip ta' osservazzjoni għandha ssirlek.

Qabel ma tieħu MAYZENT®



Trattamenti oħrajn

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi trattament li jbiddel is-sistema immuni tiegħek jew trattament li jista' jwassal biex titbaxxielek ir-rata tat-taħbit tal-qalb.

Jaf ikollok bżonn tbiddel jew twaqqaf għal mument it-trattament tiegħek tas-soltu għal perjodu qasir ta' żmien. Dan minħabba li l-effetti ta' dawn il-mediċini jistgħu jiżdiedu meta jintużaw flimkien ma' MAYZENT®.

MAYZENT® mhuwiex irrakkommandat jekk għandek ġertu mard tal-qalb jew qed tieħu mediċini oħrajn magħrufa li jbaxxu r-rata tat-taħbit tal-qalb.

L-ewwel darba li tieħu MAYZENT®



Rata baxxa tat-taħbit tal-qalb

Mat-tnedija tat-trattament, MAYZENT® jista' jwassal biex ir-rata tat-taħbit tal-qalb titbaxxa temporanjament, li jaf iwassal biex tħossok stordut jew tħoss rasek iddur bik. Għal bosta pazjenti, ir-rata tat-taħbit tal-qalb terġa' lura għan-normal fi żmien għaxart ijiem.

- M'għandekx issuq jew tħaddem magni matul l-ewwel ġurnata meta jinbeda t-trattament b'MAYZENT®, minħabba li taf tħossok stordut.

Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk tħossok stordut, imdardar, għajjen, jew tħoss palpitazzjonijiet wara l-ewwel doža li tieħu jew matul l-ewwel ħamest ijiem minn meta tibda t-trattament.

Jekk diġà tbati minn xi kundizzjoni tal-qalb, it-tabib tiegħek se jitolbok tibqa' l-klinika tiegħu jew l-isptar għal mill-inqas sitt sīghat wara li tieħu l-ewwel doža ħalli b'hekk ikun jista' jiċċekkjalek ta' spiss il-pressjoni tad-demm u l-polz u jkun jista' jagħmllekk elettrokardjogramma (ECG) biex jiċċekkja r-ritmu ta' qalbek. Jekk l-ECG tiegħek juri xi anormalitajiet matul dan il-ħin, jaf ikollhom bżonn iżommok għal aktar osservazzjoni (jista' jkun sal-ġħada) sakemm ma jgħaddix kollox.

Tnedija tat-trattament b'MAYZENT®



It-trattament tiegħek se jinbeda b'pakkett ta' titrazzjoni mifrux fuq ħamest ijiem. Se tibda b'doża ta' 0.25 mg (pillola waħda) fl-ewwel u t-tieni jum u wara 0.5 mg fit-tielet jum (żewġ pilloli), 0.75 mg fir-raba' jum (tliet pilloli) u 1.25 mg fil-ħames jum (ħames pilloli), sakemm tintlaħhaq id-doża ta' trattament irrakkomandata (jew 2 mg jew 1 mg skont ir-riżultati tat-test tad-demm tiegħek jew tar-riq magħmul qabel it-tnedija tat-trattament) mis-sitt jum 'il quddiem.





Il-fatt li d-doża ta' MAYZENT® se tiżdied gradwalment fuq medda ta' ħamest ijiem jgħin biex jonqos l-effett temporanju fuq qalbek mat-tnedija tat-trattament mogħti.

Hu l-pilloli tiegħek ta' MAYZENT® darba kuljum. Idealment, dan għandek tagħħmlu fl-istess ħin kuljum. Għall-ewwel sitt ijiem, huwa ssuġġerit li tieħu l-pilloli li nghatawlek filgħodu. Il-pilloli ħudhom mal-ikel jew waħedhom.


Skeda ta' trattament b'MAYZENT®

Pakkett ta' titrazzjoni: skeda ta' trattament mifruxa fuq ġamet ijiem

Doża ta' trattament



JEW*



Tista' timmarka l-kaxxi fl-immaġini ta' fuq biex tara kif miexi fit-trattament tiegħek jew tista' tissettja l-mobile tiegħek biex ifakkrek.

Importanti li tiftakar li trid tieħu l-pilloli kuljum. Matul l-ewwel sitt ijiem mit-trattament, jekk xi darba minnhom tinsa tieħu xi doża, ikollok terġa' tibda t-trattament mill-bidu b'pakkett ta' titrazzjoni ġdid.

*(skont ir-riżultati tad-demm tiegħek jew it-test tar-riq imwettqa qabel it-tnejja tat-trattament)

Effetti sekondarji u riskji potenzjali: sintomi fil-vista



MAYZENT® jista' jwassal biex jintefaħ fuq wara tal-ghajn. Din il-kundizzjoni hija magħrufa bħala edema makulari u hija riversibbli jekk tinqabad kmieni.

Is-sintomi li jistgħu jidhru jafu jinkludu:

- Vista mċajpra jew immewġa fiċ-ċentru tal-ghajn
- Titlef il-vista
- Kuluri jidhru mitfijin jew mibdula

Għid lit-tabib tiegħek minnufih dwar kull tibdil li tinnota fil-vista tiegħek, matul it-trattament u sa erba' ġimġħat wara li tkun waqqfa it-trattament b'MAYZENT®.

Effetti sekondarji u riskji potenzjali: infezzjonijiet



Minħabba li MAYZENT® jaffettwa s-sistema immuni, taf tkun aktar suxxettibbi għall-infezzjonijiet. Jekk għandek xi wieħed mis-sintomi li ġejjin matul it-trattament, u sa erba' ġimġħat minn mindu twaqqaf it-trattament, għarrraf lit-tabib tiegħek minnufih.

Sintomi possibbli ta' infezzjoni serja (eż. meningīte) huma:

- Deni
- Sintomi li jixbħu lil tal-influwenza
- Uġiġħ ta' ras flimkien ma' ebusija fl-għonq
- Dardir u/jew konfużjoni

Jekk taħseb li I-SM tiegħek qed taggrava b'heffa akbar (eż. thossox dgħajjef, ikollok aċċessjonijiet jew tibdil fil-vista) jew jekk tinnota sintomi ġodda jew mhux tas-soltu (eż. uġiġħ ta' ras, tibda tinsa, tinbidillek il-burdata jew l-attitudni), kellem lit-tabib tiegħek mill-aktar fis. Dawn jafu jkunu minħabba infezzjoni rari ħafna fil-moħħġ imsejħha lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML) li tista' sseħħ f'pazjenti li qed jieħdu medicini bħal MAYZENT® u medicini oħra jn użati għat-trattament tal-SM.

Effetti sekondarji u riskji potenzjali: funzjoni tal-fwied



MAYZENT® jista' jwassal għal riżultati mhux normali tat-testijiet tal-funzjoni tal-fwied.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk tinnota sintomi bħal:

- Dardir bla mistenni
- Rimettar
- Uġigħi f'żaqqek
- Għeja
- Raxx
- Sfurija f'għajnejk jew fil-ġilda
- Awrina skura

Dawn is-sintomi jistgħu jkunu sinjal ta' problemi fil-fwied u għandek tkellem lit-tabib tiegħek li se jagħmillek test tal-funzjoni tal-fwied.

Effetti sekondarji u riskji possibbi: tumuri



Waqt li qed tingħata t-trattament b'MAYZENT®, se jiżdiedlek ir-riskju li jkollok tumuri fil-ġilda.

Kun ġert li tuża protezzjoni għal kontra x-xemx meta tkun fix-xemx.

M'għandekx tingħata fototerapija b'radjazzjoni UV-B jew fotokemoterapija PUVA (trattamenti użati għal xi kundizzjonijiet tal-ġilda) waqt li tingħata trattament b'MAYZENT®.

Pazjenti nisa



Għandek tevita li toħroġ tqila waqt li qed tieħu MAYZENT® minħabba li hemm ir-riskju li ssir ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

Jekk toħroġ tqila waqt li għaddejja bit-trattament, jew fi żmien għaxart ijiem wara li tkun waqqaft it-trattament b'MAYZENT®, għarraf lit-tabib tiegħek minnufih.



Tkellem mat-tabib tiegħek dwar metodi affidabbli ta' kontraċezzjoni li għandek tuża waqt it-trattament b'MAYZENT® u għal mill-inqas għaxart ijiem wara li tkun waqqaft it-trattament.

Nisa li qed jingħataw MAYZENT® m'għandhomx ireddgħu minħabba l-effetti sekondarji li jista' jkun hemm għat-trabi.

Jekk inti mara li tista' toħroġ tqila, għandek tingħata wkoll il-Kartuna ta' Tfakkir dwar Tqala u jrid isirlek test negattiv tat-tqala qabel ma tibda t-trattament u mbagħad wara minn żmien għal żmien.

**MAYZENT® m'għandux jintuża jekk inti tqila jew
jekk inti mara li tista' toħroġ tqila li mhux qed tuża
kontraċezzjoni effettiva.**

Tilqimiet



Evita li tieħu tilqimiet ħajjin bħal tat-tuberkuloži (BCG), il-ħosba, id-deni tas-suffejra u tar-rotavirus waqt li qed tieħu MAYZENT® u għal erba' ġimġħat wara li tkun waqqfa it-trattament.

It-tilqimiet jafu jkunu anqas effettvi jekk jittieħdu waqt it-trattament.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek bżonn xi tilqima. It-trattament tiegħek jaf ikollu jitwaqqaf għal ġimġha qabel ma tieħu t-tilqim u jerġa' jinbeda b'pakkett ta' titrazzjoni xahar wara t-tilqima.

Meta tinsa tieħu l-pilloli tiegħek u twaqqaf it-trattament



TERĞAX TIBDA T-TRATTAMENT BID-DOŽA TIEGħEK TAS-SOLTU JEKK:

- Tinsa xi darba tieħu t-trattament tiegħek matul l-ewwel sitt ijiem mit-trattament tiegħek
- Tinsa tieħu t-trattament tiegħek għal erbat ijiem jew aktar wara xulxin meta għadek għaddej bid-doža ta' trattament ordnata mit-tabib

Jekk isseħħi xi waħda minn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet, ikollok bżonn terġa' tibda t-trattament mill-bidu b'pakkett ta' titrazzjoni ġdid, kif ukoll trid terġa' ssir osservazzjoni wara l-ewwel doža mogħtija lil pazjenti b'riskju kardjovaskulari. Kellem lit-tabib tiegħek biex jara meta se terġa' tibda t-trattament tiegħek.

Meta twaqqaf it-trattament tiegħek b'MAYZENT®



Wara li twaqqaf it-trattament tiegħek b'MAYZENT®, informa lit-tabib tiegħek minnufih jekk taħseb li s-sintomi tal-marda sejrin għall-agħar (eż. tkossok dghħajjef jew tara tibdil fil-vista) jew jekk tinnota xi sintomi ġodda.

Dettalji fejn tikkuntattja lit-tabib tiegħek

Isem

Indirizz

.....

Numru tat-telefon

Kwalunkwe suspectt ta' reazzjoni mhux mixtieqa mill-mediċina (effetti sekondarji) u żball terapewtiku jistgħu jiġu rrappurtati lill-Awtorità dwar il-Mediċina billi timtela l-formula rispettiva fit-taqṣima Reazzjonijiet Avversi mill-Mediċina, misjuba online, fl-indirizz elettroniku <http://www.medicinesauthority.gov.mt/adrportal> u tintbagħha bil-posta jew b'email li:

P: It-Taqsima tal-Farmakoviġilanza fid-Direttorat dwar il-Liċenzi, L-Awtorità dwar il-Mediċini, Sir Temi Zammit Buildings, Malta Life Sciences Park, San Ģwann, SGN 3000.

E: postlicensing.medicinesauthority@gov.mt

Il-Professionisti tal-Kura tas-Saħħa jistgħu wkoll jirrappurtaw kull episodju mhux mixtieq marbut mal-użu ta' **MAYZENT** lil Novartis Pharma Services Inc., Uffiċċju Rappreżentattiv, Malta, bit-telefown billi jċemplu fuq +356 21222872, online billi jżuru www.report.novartis.com jew b'email mibgħuta lil drug_safety.malta@novartis.com.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, L-Irlanda.

Ir-Rappreżentant Lokali: Novartis Pharma Services Inc., Uffiċċju Rappreżentattiv, Malta.
Nru tat-Tel.: +356 21222872

Sabiex tikseb kopji elettroniċi tal-Materjal Edukattiv, jekk jogħġgbok žur is-sit elettroniku tal-Awtorità dwar il-Mediċini ta' Malta - <http://www.medicinesauthority.gov.mt/rmm> - u niżżejj il-materjal meħtieġ bl-aħħar data disponibbli.

